



进口新型杀鼠剂
蜡块毒饵
农药登记证号: PD185-94

21天内消灭鼠害, 降低成本, 节省劳力



彻底灭鼠的最快速径

◆ 彻底灭鼠的最快速径:

- 新型第二代抗凝血性杀鼠剂
- 老鼠一次取食即达致死剂量
- 21天达到彻底的灭鼠效果
- 适口性佳, 易于迅速取食
- 对家鼠、野鼠均效果显著

◆ 省时省力, 降低成本:

- 杀鼠效果达100%
- 采用间歇投饵技术, 减少投饵次数
- 适口性佳, 减少投饵数量
- 独特蜡块毒饵、准确控制用量、减少浪费

◆ 对人及环境安全:

- 含有苦味剂, 降低儿童、成人误食可能
- 对野生动物和家畜无引诱作用
- 无二次中毒现象
- 中毒后, 老鼠通常在洞内死亡, 不污染环境
- 除狗以外, 对人及非靶标动物安全

◆ 使用方便:

- 块状毒饵, 剂量容易掌握
- 防霉防潮, 防止虫蛀
- 无需事先拌饵

◆ 适合各种场所灭鼠需要:

居民住宅、饭店宾馆
工厂、商店、仓库 (包括粮仓)
机关、学校、医院
畜牧场、饲养场
船舶、港口
农田、地下管道、垃圾场

◆ 使用方法:

● 调查

确定鼠密度及活动路线和取食场所

● 投 饵

次 数: 居民住所 1-2次
公共场所 1-3次
农 田 1-3次

间 歇: 7-10天

投 饵 点: 鼠洞、墙洞、下水道口、鼠类活动路线和经常出没处

饵的分布: 居民住宅 15平方米设2堆, 每堆4-8克
公共场所 每隔2-5米设1堆, 每堆4-8克
农 田 2-10米等距离投饵, 每堆4-12克

● 用 量

大鼠: 12-16克 小鼠: 4-8克

◆ 与其他杀鼠剂比较:

表一

有效成分	投饵量(克)			杀灭率%	平均致死天数
	第一周	第二周	第三周		
Brodifacoum	376.8	64.9	27.0	94.6	8.1
杀它伏	304.7	0.7		100	5.1

(田间试验总结, CRAC, Princeton, NJ)

表二

	一般杀鼠剂饱和投饵	杀它伏间歇投饵
投饵量	多	少
补饵间隔期	2-3天	7-10天
灭鼠时期	90天	21天
达致死剂量	多次取食	一次取食
反复补饵	需要	不需要
事先拌饵	需要	不需要

注意 事项

- 按标签说明使用
- 应密封于原容器中, 储存远离儿童、家畜及鸟类
- 与食物或饲料隔离
- 将用过的包装物埋掉或焚烧, 将死鼠掩埋或烧掉

急救 措施

- 不慎药剂接触皮肤或眼睛, 应用清水彻底冲洗干净
- 如果误服中毒, 不要引吐, 应立即送医院抢救
- 该药为抗凝血剂, 请按医嘱, 注射解毒剂维生素K1

巴斯夫贸易(上海)有限公司

商务请洽: 巴斯夫(中国)有限公司植保部 上海市西藏中路18号港陆广场20层 邮编: 200001 电话: (021)63851630

© 巴斯夫股份有限公司注册商标

BASF